

உள்விழி வில்லை உள்வைப்பு அறுவைமருத்துவம்

நோயாளியின் தரவு

நோயாளியின் பெயர்வயது/பாலினம்
நோயாளியின் அடையாளம்: தேதி
மகன் / மகள் முகவரி.....
தொலைபேசி.....

மருத்துவம் நடைபெறும் இடம்

சிகிச்சையின் நோக்கம்

பேகிக் உள்விழி லென்ஸ் பொருத்தும் முறை:

கிட்டப் பார்வை குறைபாட்டை சரி செய்ய அறுவை சிகிச்சை மூலம் பேகிக் உள்விழி லென்ஸ் பொருத்தும் முறை, அதற்கான தீர்வுகளில் ஒன்றாகும். இதில் கண்ணிற்குள் செயற்கை உள்விழி லென்ஸ் பொருத்தப்படும் கண்புரை அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் பொருத்தப்படும் உள்விழி லென்ஸ் போலவே பேகிக் உள்விழி லென்ஸ் உருவகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அறுவை சிகிச்சை முறையில் கண்ணில் இருக்கும் இயற்கையான லென்ஸ் அகற்றப்பட மாட்டாது. பேகிக் உள்விழி லென்ஸ் இயற்கையான லென்ஸ் உடன் சேர்த்து பொருத்தப்படும். இந்த அறுவை சிகிச்சை ஓரிட உணர்வு நீக்கி முறையில் செய்யப்படும்.

அறிகுறிகள் மற்றும் எதிர்நோக்கும் பயன்கள்:

இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்வதன் மூலம் கிட்டப்பார்வை குறைபாடு, தூரப் பார்வை குறைபாடு ஆகியன கண்ணாடிகள் அல்லது ஒட்டு லென்ஸ் துணையின்றி முன்னேற்றம் அடைய செய்யப்படும். மேலும் இவை அகற்ற கூடிய தன்மை கொண்டவை. இதில் கருவிழியின் தோற்றமும் தன்மையும் பாதுகாக்கப்படும், இதனை நோயாளரால் உணர் முடியாது. மேலும் இது

பொருத்தப்பட்டிருப்பது வெளிப்படையாக தெரியாது. மற்ற கருவிழி பார்வை குறைபாடு சரி செய்யும் லேசர் சிகிச்சைகளை போல் இது நிரந்தரமானதல்ல.

மாற்று சிகிச்சை முறைகள்

பேகிக் உள்விழி லென்ஸ் பொருத்துவதால் கண்ணாடிகள் அல்லது தொடு லென்ஸ்களின் உபயோகம் குறைக்கப்படும்.

பக்க விளைவுகள் மற்றும் சிக்கல்கள் :

நோய்த்தொற்று

- லேசான நோய்த்தொற்று மருந்துகள் மூலம் சரி செய்யப்படலாம்.
- மோசமான நோய்த்தொற்றினால் பார்வை இழப்பு ஏற்படலாம்

விழித்திரை நரம்பு விலகுதல்:

இந்த அறுவை சிகிச்சையில் விழித்திரை நரம்பு விலகி பார்வையிழப்பு ஏற்படலாம் என்பதை அறிவேன். கிட்டப்பார்வைக் குறைபாடு மிதமாகவோ அதிகமாகவோ இருப்பவர்களுக்கு விழித்திரை நரம்பு விலகல் அதிகம் நேரிடலாம்.

கண்புரை:

- எனது இயற்கையான லென்ஸில் கண்புரை ஏற்படலாம்
- அதற்கு மறு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு உள்விழி லென்ஸ் பொருத்தப்படும்.

கருவிழி பாதிப்பு:

- கருவிழியில் நீர் கோர்த்தல்
- கருவிழியின் அடிமட்ட செல்களின் சிதைவு
- இதனால் பார்வை குறைபாடு ஏற்படலாம்

கண் நீர் அழுத்த நோய்:

கண்ணிற்குள் இருக்கும் நீர் அழுத்தம் அதிகரித்து பார்வை குறைபாடு ஏற்படுதல். மேலும் யுவியைடிஸ், அதிக இரத்தக்கசிவு, விழித்திரை மையப்பகுதி வீக்கம் ஏற்படலாம். இத்தகைய சிக்கல்கள் சில நாட்களிலோ, வாரங்களிலோ மாதங்களிலோ அல்லது வருடங்களிலோ ஏற்படலாம்

பார்வைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத பக்க விளைவுகள்:

- அதிகப்படியான கண்கூச்சம்
- கூடுதலாகவோ / குறைவாகவோ கண்பார்வை சரி செய்தல்
- கூடுதல் அறுவை சிகிச்சைகள் , உள்விழி லென்ஸை சரி செய்யவோ அல்லது மாற்றவோ வேண்டி இருக்கலாம்.
- கண் பாதுகாப்பிற்கான கண்ணாடிகள் அணிய நேரிடலாம்.
- கிட்ட பார்வை (வெள்ளெழுத்து) குறைபாடு அதிவிரைவாக ஏற்படலாம்.

இந்த அறுவை சிகிச்சையினால் எனக்கு கண் பார்வை 100 சதவிகிதம் கிடைக்காமல் போகலாம் எனவும், கண் கண்ணாடிகள் உபயோகிக்க நேரிடலாம் எனவும் நன்கு அறிவேன். இதில் அறுவை சிகிச்சையினால் ஏற்படும் பக்கவிளைவுகள் மற்றும் சிக்கல்கள் முடிந்த அளவிற்கு தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் மருத்துவரின் அறிவுரையின்படி, தொடர் மறு பரிசோதனைகளுக்கு வர நேரிடலாம். எனக்கு மேற்கொள்ள இருக்கும் இந்த அறுவை சிகிச்சை பற்றிய பதிவுகளை வெளியில் பகிர முழு ஒப்புதல் அளிக்கின்றேன்.

நோயாளியின் அறிக்கை

மேற்கூறிய விவரங்கள் அனைத்தும் நன்கு அறிந்து, இதனுடைய சாதக பாதகங்களை நன்கு அறிந்து சுய நினைவுடனும், முழு மனதுடனும் சம்மதிக்கின்றேன். எனது கேள்விகள் அனைத்திற்கும் மருத்துவர் போதுமான அளவு பதிலளித்துள்ளார்.

நோயாளி/பெற்றோர்/பாதுகாவலரின் கையொப்பம்/கட்டைவிரல்பதிவு:.....
 பெயர்:.....உறவு.....தேதி.....
 முகவரி:.....
 தொலைபேசி (அலு) (வீடு) (கைபேசி).....

மருத்துவரின் ஒப்புதல்:

நான் இந்நோயைப்பற்றியும், அதற்காக மேற்கொள்ளப்பட இருக்கும் அறுவை சிகிச்சை பற்றியும் அதனால் ஏற்படும் சாதகபாதக பலன்கள் பற்றியும் நன்கு தெளிவாக அந்த நோயாளருக்கு விளக்கமளித்துள்ளேன். மேலும் இதனைப்பற்றிய சந்தேகங்கள் முழுமையாக விளக்கப்பட நோயாளருக்கு போதுமான அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.

மருத்துவரின் கையெழுத்து
 மருத்துவரின் பெயர்
 தேதி

சாட்சி 1
 கையொப்பம்:
 பெயர்:.....
 முகவரி:
 தொலைபேசி
 கைபேசி.....

சாட்சி 2
 கையொப்பம்:
 பெயர்:.....
 முகவரி:
 தொலைபேசி:
 கைபேசி