

# பண்டஸ் ப்ளோரெசின் ஆஞ்சியோகிராபி / ஆப்தல்மோஸ்கோபி/ இந்தோசயனைன் கிரீன் ஆஞ்சியோகிராபி

## நோயாளியின் தரவு

நோயாளியின் பெயர் .....வயது/பாலினம் .....  
நோயாளியின் அடையாளம்: ..... தேதி .....  
மகன் / மகள் ..... முகவரி .....  
தொலைபேசி .....

## முன்மொழியப்பட்ட மருத்துவம்

என் (நோயாளியின் பெயர் ..... ) கண்ணின் உட்பக்கம் பாதிப்பு உள்ளதும் அங்குள்ள ரத்தக்குழாய்களை சிறப்பு சாயம் பயன்படுத்தி புகைப்படம் எடுத்து ஆராயவேண்டும் என்பதையும் அறிந்து கொண்டேன்.

இந்த பரிசோதனையானது, ஃப்ளோரெசின் (Fluorescein Dye) அல்லது / மற்றும் இண்டோசயனைன் பச்சை நிற (indocyanine Green Dye) சிறப்பு சாயங்களை உங்கள் கை நரம்பு ஒன்றில் செலுத்தி, அந்த சிறப்பு சாயம் கண்களை சென்றடைந்தவுடன் அதன் ஓட்டத்தை புகைப்படங்கள் எடுத்து பரிசோதிப்பதாகும். இந்த பரிசோதனையின் மூலம் கண்ணின் விழித்திரை மற்றும் கோராய்ட் ஆகியவற்றில் உள்ள இரத்தக்குழாய்களின் அமைப்பையும் செயலையும் கண்டறியமுடியும்.

இந்த பரிசோதனையானது, ஃப்ளோரெசின் அல்லது / மற்றும் இண்டோசயனைன் பச்சை நிற சிறப்பு சாயங்களை உங்கள் கை நரம்பு ஒன்றில் செலுத்தி, அந்த சிறப்பு சாயம் கண்களை சென்றடைந்தவுடன் அதன் ஓட்டத்தை தொடர் புகைப்படங்கள் மூலமாகவோ மருத்துவரின் தலையின் மீது அணியப்படும் சிறப்பு பரிசோதனைக்கருவியின் மூலமாகவோ பரிசோதிப்பதாகும்.

இந்த ஆய்வில் கிடைக்கும் தகவல்கள் உங்கள் சிகிச்சையைத் திட்டமிடவும் சிகிச்சையின் முடிவுகளை மதிப்பிடவும் உங்கள் மருத்துவருக்கு உதவுகிறது. இந்த சோதனையில் ஊசி குத்துதல் மற்றும் புகைப்படக்கருவியின் ஒளி மின்னல் சற்று அசௌகரியம் அளிக்கலாம். இவை பாதிப்பை உண்டாக்குவது அரிது. ஒரு சிலருக்கு ஊசி உட்செலுத்தப்பட்ட ஒரு நிமிடத்திற்குப் பிறகு குமட்டல் (வாந்தி உணர்வு) இருக்கலாம். இது வழக்கமாக சுமார் 30 வினாடிகளில் அடங்கிவிடும். அமைதியாக இருந்து ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்தால் இந்த சிரமத்தை சமாளிக்க முடியும். இந்த சோதனைக்கு மூன்று மணி நேரத்திற்கு முன்பு

நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. உங்கள் வழக்கமான உணவை பரிசோதனைக்கு பிறகு எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

ஃப்ளோரெசின் (Fluorescein) பொதுவாக நச்சுத்தன்மையற்ற மருந்தாகும். அரிதாக, லேசான ஒவ்வாமை உருவாகலாம். தேவையான மருந்துகளை எடுத்தால், விரைவாக சரியாகிவிடும். உயிருக்கு ஆபத்தான சிக்கல்களும் பக்க விளைவுகளுக்கும் அரிதானவை, ஆனால் நிகழலாம். மற்ற மருந்துகளால் ஏற்படக்கூடியவற்றிலிருந்து இந்த ஒவ்வாமை வேறுபட்டது அல்ல. தோல் மற்றும் சிறுநீரில் 36 மணி நேரம் ஃப்ளோரெசின் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். இந்த சோதனையின் போது நீங்கள் ஒரு உதவியாளருடன் இருக்க வேண்டும்.

### நோயாளியின் அறிவிப்பு

கண் மருத்துவக் குழுவைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் கண்ணின் உட்பக்கம் உள்ள ரத்தக்குழாய்களை சிறப்பு சாயம் பயன்படுத்தி புகைப்படம் எடுத்து ஆராயும் பரிசோதனை பற்றி விளக்கியுள்ளனர். இதைப்பற்றிய எனது கேள்விகளை கேட்க வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. எனது கேள்விகளுக்கு திருப்திகரமான பதில்களும் அளிக்கப்பட்டன.

மேற்கூறியவற்றை நன்கு உணர்ந்து, இந்த பரிசோதனைக்கு எனது முழு சம்மதத்தை தெரிவிக்கிறேன்.

நோயாளி/ பெற்றோர்/ பாதுகாவலரின் கையொப்பம் / கட்டைவிரல் பதிவு:.....  
 பெயர்:.....உறவு.....தேதி.....  
 முகவரி:.....  
 தொலைபேசி(அலு).....(வீடு) ..... (கைபேசி.) .....

## மருத்துவரின் பிரகடனம்

செய்யவிருக்கும் கண்ணின் உட்பக்கம் உள்ள ரத்தக்குழாய்களை சிறப்பு சாயம் பயன்படுத்தி புகைப்படம் எடுத்து ஆராயும் பரிசோதனை பற்றி அதன் தன்மை, எதிர்பார்க்கப்படும் விளைவுகளை மற்றும் அதன் அபாயங்களை நோயாளியிடம் தெளிவாக விளக்கியுள்ளேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன்.

நான் நோயாளிக்கு சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் கேட்க வாய்ப்பு கொடுத்துள்ளேன். அவற்றிற்கு நான் அவருக்கு புரியும்படி திருப்தியான பதில்களும் அளித்துள்ளேன்.

மருத்துவரின் கையெழுத்து .....

மருத்துவரின் பெயர் .....

தேதி .....

சாட்சி 1

கையொப்பம்: .....

பெயர்:.....

முகவரி: .....

தொலைபேசி .....

கைபேசி.....

சாட்சி 2

கையொப்பம்:

பெயர்:.....

முகவரி: .....

தொலைபேசி: .....

கைபேசி.....