

## மாறு-கண் பார்வை அறுவை மருத்துவம்

### நோயாளியின் தரவு

நோயாளியின்பெயர்..... வயது/பாலினம்.....  
நோயாளியின் அடையாளம்:..... தேதி..... மகன்/மகள்.....  
முகவரி..... தொலைபேசி.....

### மருத்துவம் நடைபெறும் இடம்

### மாறுகண் பற்றிய தகவல்கள்:

அணைத்து வயதினருக்கும் மாறுகண் அறுவைச் சிகிச்சையினைச் செய்யலாம். இதனால் இரு கண்களின் ஒருங்கிணைந்த பார்வை Binocular Singular Vision முப்பரிமான பார்வை (3-D) பார்வையின் ஆழம் (Depth Perception), பார்வைப் பரப்பளவு (Field of Vision) என்று எல்லாவிதமான பார்வையையும் சிறப்பாக்க முடியும்.

### அறுவைச் சிகிச்சையின் போது நடக்கும் நிகழ்வுகள்:

குழந்தைகளுக்கும், சில குறிப்பிட்ட வித்தியாசமான மாறு கண் நோய் உள்ளவர்களுக்கும் முழு மயக்க மருந்து செலுத்தப்படும்.

பெரியவர்களுக்கு கண்ணில் மரத்துப்போகும் ஊசி செலுத்தப்படும்.

இந்த அறுவை சிகிச்சையின் போது குறிப்பிட்ட கண் தசைகளை இறுக்கவோ அல்லது தளர்த்தவோ செய்து கண்களை நேராக மாற்றி அமைக்கப்படும்.

### அறுவை சிகிச்சை தொடர்புடைய சில பக்கவிளைவுகள்:

மயக்க மருந்து காரணமாக மிக சிலருக்கு மூச்சுத்தினறல்கள், வாந்தி, தொண்டைப்புண் மாரடைப்பு போன்ற அபாயங்கள் ஏற்படலாம்.

கண்ணில் மரத்துப் போகும் ஊசி போடுவதால் சிலருக்கு கண் விழி துளைத்தல், பார்வை நரப்பு மற்றும் விழித்திரை பாதிப்பு, கண் இமை இறங்குதல், இரத்த அழுத்தம், சுவாச கோளாறு, மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.

அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பிறகு மிகையான மற்றும் குறைவான திருத்தங்கள் 10% நபருக்கு அமையலாம். அதைச் சீரமைப்பதற்காக மீண்டும் ஒரு அறுவைச் சிகிச்சை தேவைப்படலாம்.

## சாதாரண பக்கவிளைவுகள்:

கண்ணின் வீக்கம், தையல்களுக்கு எதிர்வினை, வலி, தற்காலிக இரட்டை பார்வை, தற்காலிக மங்கலான் பார்வை, கண் இமைகளின் நிலை மாற்றம் மற்றும் கண்வடு, நீர்க்கட்டிகள் உருவாக்கம் ஆகியவை அடங்கும்.

## பொதுவான செய்திகள்:

- ❖ அறுவை மருத்துவத்துவத்துக்குப் பிறகு முதல் சில நாட்களில் கண்களில் அசௌகரியம், சிவத்தல் மற்றும் கண் இமைகள் வீங்கியிருப்பது பொதுவானது.
- ❖ குழந்தை ஏற்கனவே கண்ணாடி அணிந்திருந்தால் அறுவைச் சிகிச்சைக்குப் பிறகும் கண்ணாடி அணிவதைத் தொடர வேண்டும்.
- ❖ அறுவை மருத்துவத்துவத்துக்குப் பிறகு கண்கள் ஒட்டப்படுவதில்லை கண்களில் நிரந்தர வடு இருக்காது.
- ❖ அறுவை மருத்துவத்துவத்துக்குப் பிறகு ஒரு மாதம் வரர ஒரு நாளைக்கு 3 முதல் 6 முறை கண் மருந்து போட வேண்டும்.
- ❖ அறுவை மருத்துவத்துவத்துக்குப் பிறகு தற்காலிக இரட்டைப் பார்வை பொதுவானது.
- ❖ கரையக் கூடிய தையல்கள் பயன்படுத்தப்படுவதால் அறுவை மருத்துவத்துவத்துக்குப் பிறகு தையல் பிரிக்கப்பட வேண்டியதில்லை.

## தகவல் அறிந்து அளிக்கும் ஒப்புதல் சான்று

மாறுகண் அறுவைச் சிகிச்சை சம்பந்தமான பக்கவிளைவுகள் மற்றும் நன்மைகளை இந்த ஒப்புதல் படிவத்தை முழுமையாக படித்து நான் புரிந்து கொண்டேன். நான் என் கண் மருத்துவரிடம் பேசி அவர்கள் விளக்கத்தில் நன்கு திருப்தி அடைந்துள்ளேன். எனது குழந்தையின் அறுவை சிகிச்சை தொடர நான் அவர்களுக்கு சம்மதம் அளிக்கிறேன். அறுவை சிகிச்சையின் போது ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான, இடையூறான நிலை ஏற்பட்டால் உடனடியாக எனது கண் அறுவை மருத்துவர் தேவையானதைச் செய்ய நான் ஒப்புதல் அளிக்கிறேன்.

நோயாளி/ பெற்றோர்/ பாதுகாவலரின் கையொப்பம்/ கட்டைவிரல் பதிவு:  
 பெயர்.....உறவு.....தேதி.....  
 முகவரி: .....  
 தொலைபேசி (அலு)..... (வீடு).....(கைபேசி).....

## மருத்துவரின் பிரகடனம்

நான்செய்யவேண்டியசெயல்முறையின்தன்மைமற்றும்விளைவுகளைவிளக்கியுள்ளேன்என்றும்,குறிப்பாகநோயாளிக்குஏற்படும்அபாயங்கள்குறித்துவிவாதித்ததாகவும்அறிவிக்கிறேன்.  
நான்நோயாளிக்குகேள்விகளைக்கேட்கஒருவாய்ப்பைக்கொடுத்துள்ளேன், நான்இதற்குப்பதிலளித்துள்ளேன்.

மருத்துவரின் கையெழுத்து  
மருத்துவரின் பெயர்  
தேதி

.....  
.....  
.....

சாட்சி 1

சாட்சி 2

கையொப்பம்: .....

கையொப்பம்: .....

பெயர்: .....

பெயர்: .....

முகவரி: .....

முகவரி: ..

தொலைபேசி .....

தொலைபேசி: .....

கைபேசி .....

கைபேசி .....